

ORAL AIRWAY



Oral airway, (orofarengal t p) sert plastikten yapılmış t p şeklinde olup ađız iinden yerleřtirilir. Kavisli yapısı ve distal ucunun dil k k  arkasına yerleřmesi ile dili  ne dođru kaldırır ve tıkanmayı  nler.

Endikasyonları

- Bilinci kapalı olan
- kusma (gag) refleksi olmayan
- enesi kilitli olmayan
- Ađız ii travması olmayan hastalarda havayolu aıklıđını sađlamak iin kullanılır

Oral airway seimi

- Farklı boyutları bulunmaktadır bu nedenle Oral airway, hastanın yařına ve cinsiyetine uygun seilmelidir.
- Hastaya uygun boyuttaki oral airwayin seimi iin uzunluđu, dudak kenarından kulak memesine kadar olan airway seilir.
-  n diřler ile angulus mandibula arasındaki mesafe de  lölerek uygun boyutta airway seilebilir.
- Oral airwayin larengeal yapıları zedelemeyecek uygun boyunun kullanılması gerekir.
- Uzun airway, epiglotu larenks giriřine iterek tıkanmaya, larengeal refleksleri uyararak kusmaya ve larengospazma neden olur.
- Kısa airway ise dil k k n n arkasına yerleřmeyeceđinden dili yeterince kaldıramaz ve dil k k n  larenkse dođru iterek havayolunun tıkanmasına neden olur.

Oral airway yerleřtirme tekniđi /Kullanımı

- Eldiven giyilir.
- Ađız iinde kan, kusmuk, yabancı cisim varsa temizlenir.
- Hastanın havayolu aıklıđını sađlamak amacıyla bařa ekstansiyon pozisyonu verilir.
- Uygun boyutta oral airway seimi yapılır.
- ene  ne dođru ekilerek hastanın ađzı aılır.

- Oral airwayin iç bükey kısmı sert damağa bakacak şekilde ağız içine yerleştirilir.
- Damak üzerinde kaydırılarak ilerletilirken 180° döndürülür
- Dudaklara dayanıncaya kadar farenkse doğru itilir.

DİKKAT: Bebeklerde airway, ağız yolunun kısa olması ve üst damağın yeterince olgunlaşmamasına bağlı olarak kanama görülmesi nedeniyle düz yerleştirilir

Dikkat edilecek hususlar

- Dil ve dudaklar airway ile dişler arasında kalmamalıdır.
- Kuvvetle sıkılmış çene, diş ve dişetlerinin yaralanmasına neden olabilir.
- Mide içeriğinin regürjitasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
- Hastanın herhangi bir reaksiyon göstermesi durumunda airway hemen çıkartılmalıdır.

Oral airwayin çıkarılması

- Hastanın bilincinin yerine gelmesi veya havayolu açmak için daha ileri bir teknik (orotrakeal entübasyon, LMA) uygulanması nedeniyle airway çıkarılır.
- Hastanın başına ekstansiyon pozisyonu verilir.
- Airway geri doğru çekilir.
- Ağız içinden çıkartılıp tıbbi atık çöpüne atılır.